

Elem rendje, ciklikus csoport, részcsoporth, izomorfia

- Értelmezzük az egész számok \mathbb{Z} halmazán az $a * b = a + b + 1$ képlettel megadott műveletet (lásd Kilencedik gyakorlat 1/d feladat). Bizonyítsd be, hogy a $(\mathbb{Z}, *)$ csoport izomorf a $(\mathbb{Z}, +)$ csoporttal, ahol $+$ a szokásos összeadást jelöli.
- Döntsd el, hogy az alábbi H részhalmazok részcsoporthot alkotnak-e a megfelelő G csoportban:
 - G a komplex számok halmaza a szokásos összeadással, H a valós számok halmaza;
 - G a komplex számok halmaza a szokásos szorzással, H az egységnyi abszolút értékű komplex számok halmaza;
 - G az egész számok halmaza a szokásos összeadással, H a hárommal egy maradékot adó egészek halmaza.
- Állapítsuk meg, hogy az alábbi két csoport izomorf-e egymással:
 - a mod 4 maradékosztályok a mod 4 összeadással
 - a mod 8 redukált maradékosztályok a mod 8 szorzással.
- Határozd meg a D_8 diédercsoportban az alábbi elemek rendjét!

 f_{45} $f_{90} \cdot t_1$ f_{90} f_{135}

- Egy csoport rendje 81 és van olyan eleme, melynek 27. hatványa nem az egységelem. Bizonyítsuk be, hogy a csoport kommutatív!
- A G csoport $g \in G$ elemére $o(g) = 10$. Mennyi $o(g^3)$ értéke?
- A H halmaz álljon az összes olyan rendezett számpárból, amelynek az első tagja egész szám, a második tagja 0 vagy 1. (Azaz: $H = \{(a, b) | a \in \mathbb{Z}, b \in \{0, 1\}\}$.) Értelmezzük H -n a \oplus műveletet a következőképpen:

$$(a_1, b_1) \oplus (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, (b_1 + b_2) \bmod 2).$$

(Azaz: a számpárokat tagonként összeadjuk és az eredmény második tagjának 2-es maradékát vesszük. Például: $(7, 1) \oplus (12, 1) = (19, 0)$.)

- Bizonyítsuk be, hogy H csoportot alkot a \oplus műveletre nézve!
- Milyen rendű elemek fordulnak elő H -ban?
- Ciklikus csoport-e H ?

(ZH, 2003. május 15.)

- Mik az egyes elemek rendjei a 12 rendű ciklikus csoportban?
 - Hány olyan eleme van a C_n ciklikus csoportnak, ami egymaga generálja a teljes C_n csoportot?
- Legyen H és K egy G csoport két véges részcsoporthja, melyekre teljesül, hogy $\text{lnc}(|H|, |K|) = 1$, vagyis H és K rendje relatív prímek. Mutassuk meg, hogy ekkor $H \cap K = \{e\}$, ahol e a G csoport egységeleme. (ZH, 2004. április 29.)
- A valós számsorozatok halmaza csoportot alkot a számsorozatok összeadására, mint műveletre nézve (ezt könnyű ellenőrizni). Döntsd el, hogy az alábbi részhalmazok részcsoporthot alkotnak-e ebben a csoportban?
 - a konvergens számsorozatok halmaza;
 - a divergens számsorozatok halmaza;
 - a korlátos számsorozatok halmaza;
 - a monoton növekvő számsorozatok halmaza.
- Legyen G csoport, H és K pedig G -nek részcsoporthjai. Mutassuk meg, hogy $H \cup K$ akkor és csak akkor részcsoporthja G -nek, ha vagy $H \subseteq K$, vagy $K \subseteq H$. (ZH, 2002. június 4.)
- Egy szabályos ötszög csúcsait számozzuk meg az óramutató járásával ellenkező irányban 1-től 5-ig. Jelölje t_i az i -edik csúcson, és a vele szemközti oldal felezőpontján átmenő tengelyre való tükrözést. Jelölje f_{72} , f_{144} , f_{216} és f_{288} az ötszög középpontja körüli, megfelelő szögű forgatást. Végül jelölje I az identitást. Végezd el a szabályos ötszög szimmetriacsoportjában az alábbi műveleteket!

 $f_{144} \cdot t_1$ $f_{72} \cdot t_2 \cdot f_{72} \cdot t_2$ $(t_1 \cdot t_3)^{-1}$

- Igazold, hogy egy páratlan rendű Abel-csoportban az összes elem szorzata az egységelem.
- Van-e olyan 20 elemű csoport, amelyben
 - van 5 rendű elem, de nincs 20 rendű elem;
 - van 20 rendű elem, de nincs 5 rendű elem?
 (ZH, 2003. április 30.)